



La salud
es de todos

Minsalud

VIRUELA SÍMICA

Virus transmitido a los humanos por
animales infectados.



Es un **virus transmitido** a los humanos
por animales infectados.

Puede ser transmitido de humano a
humano por **contacto físico estrecho.**

Sus síntomas son similares a la
viruela y duran de 2 a 4 semanas.



La salud
es de todos

Minsalud

VIRUELA SÍMICA

El contacto físico estrecho con personas infectadas constituye el factor de riesgo de infección más importante.





SE TRANSMITE PRINCIPALMENTE POR:

- Contacto estrecho con otras personas infectadas.
- Contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias (tos y estornudos).

SÍNTOMAS

- **Fiebre**
- **Dolor de cabeza intenso**
- Inflamación de los ganglios linfáticos de mentón, cuello e ingle
- **Dolores musculares**
- Cansancio crónico
- **Brote en la piel**

Estos son:

- Fiebre que puede o no presentarse.
- **Dolor de cabeza intenso**
- Inflamación de los ganglios linfáticos de mentón, cuello e ingle
- **Dolores musculares**
- Falta de energía
- **Brote en la piel.**

Las lesiones de la piel comienzan entre los días 1 y 3, que pueden ser posteriores a la aparición de la fiebre o sin ella.

Tiende a concentrarse más en la cara y las extremidades, que en el tronco.

Los síntomas de la viruela símica son los siguientes:

- Erupción con ampollas en la cara, manos, pies, cuerpo, ojos, boca o genitales
- Fiebre
- Ganglios linfáticos inflamados
- Dolores de cabeza
- Dolores musculares y de espalda
- Poca energía

Estos son:

- Fiebre que puede o no presentarse.
- **Dolor de cabeza intenso**
- Inflamación de los ganglios linfáticos de mentón, cuello e ingle
- **Dolores musculares**
- Falta de energía
- **Brote en la piel.**

Las lesiones de la piel comienzan entre los días 1 y 3, que pueden ser posteriores a la aparición de la fiebre o sin ella.

Tiende a concentrarse más en la cara y las extremidades, que en el tronco.

Para prevenir el contagio:



Evita el contacto piel a piel con personas que tienen lesiones cutáneas similares a las de la viruela.



No compartas utensilios domésticos como: cucharas, vasos, ropa de cama, toallas, celulares, cepillos de dientes, entre otros, con personas que hayan sido diagnosticadas con viruela símica.

¿Cómo se diagnostica?

La confirmación se realiza mediante pruebas de laboratorio.



Se deben recolectar **muestras de fluidos** tomados de más de una lesión en la piel, que tengan apariencia distinta entre sí, e idealmente, de diferentes zonas del cuerpo, sangre y respiratorias.

Los síntomas suelen resolverse espontáneamente, la atención clínica es clave para aliviarlos, controlar las complicaciones y evitar secuelas.

La transmisión entre humanos ocurre:



Durante el **contacto físico directo** y cercano.



Por la exposición a gotas de secreciones respiratorias grandes (**tos y estornudos**).



Por el contacto con la ropa, toallas y artículos personales de una persona infectada.

Si presentas síntomas o fuiste diagnosticado con viruela símica:

- ▶ Ponte en contacto con tu EPS.
- ▶ **Aíslate en casa inmediatamente.**
- ▶ Mantente separado de las personas que viven contigo y de tu mascota, cuando te sea posible.
- ▶ Utiliza tapabocas.